Monocrotophos-36% S.L.
(Insecticide)

A systemic and contact soluble liquid formulation based on Monocrotophos technical *Caution : Toxic to aquatic organisms hence should not be used near water bodies, aquaculture or pisciculture. It is toxic to honeybees, spray application should be avoided during foraging period of bees. Product is highly toxic to birds.

Recommendation :

Crop(s)	Common Name of Pest	Dosage/HA AI (gm)	Formulation (ml)	Dilution in Water (litre)	Waiting Period between last spray to harvest day	Re-entry after each Application (In Hours)
Black gram	Pod borer	250	625	500-1000		-
Cardamom	Thrips	375	937	500-1000		-
Citrus	Black aphids, Mite	0.040%, 0.025%	1500-2000, 937-1250	500-2000	10 liter/tree	
Coconut	Black headed caterpillar	3.5-7 gm/tree	8.75-17.5 ml/tree	Lower dose to be applied on plants below 9 years	-	-
Coffee	Green bug	625	1562	500-1000		-
Cotton	Spotted boll worm	450-800	1125-2250	500-1000	-	
Cotton	Pink boll worm	800	2250	500-1000		
	Grey weevil	500	1250	500-1000		
	Spotted boll worm	450-800	1125-2250	500-1000		
	Leaf hopper	175	437	500-1000		
	Thrips	175	437	500-1000		-
	White fly	200	500	500-1000		-
	Aphid	175	437	500-1000		-
	Leaf hopper	175	437	500-1000		-
	American boll worm	450-800	1125-2250	500-1000		-
	Aphid	175	437	500-1000		
	American boll worm	450-800	1125-2250	500-1000		
	Grey weevil	500	1250	500-1000		-
	Pink boll worm	800	2250	500-1000		-
	Thrips	175	437	500-1000		
	White fly	200	500	500-1000		
Green gram	Pod borer	175	437	500-1000		-
Maize	Shoot fly	250	625	500-1000		
	Shoot fly	250	625	500-1000	-	
Mango	Bug mite, Gall Maker hopper, Melay bug, Shoot borer	0.040%, 0.04%	1500 -2000	500-2000	10liters /tree 20 liter/tree	
Paddy	Yellow stem borer	500	1250	500-1000		
	Yellow stem borer	500	1250	500-1000		-
	Green Leaf hopper	250	625	500-1000		-
	Green Leaf hopper	250	625	500-1000		-
	Brown plant hopper	500	1250	500-1000		-
	Leaf roller/folder	250	625	500-1000		-
	Leaf roller/folder	250	625	500-1000		-
Pea	Leaf miner	400	1000	500-1000		
	Leaf miner	400	1000	500-1000		-
Red gram	Plume mouth, Pod borer, Pod fly	250, 500, 250	625, 1250, 625	500-1000		-
Sugar cane	Shoot borer, Mealy bug, Pyrilla scale insect, Stalk borer	600-800, 600, 200,600,750 1500, 1875	1500-2250, 1500, 500,	500-1000		

Direction Of Use : WARNING: BANNED FOR USE ON VEGETABELS P.P. Equipment:-Knapsack sprayer, foot sprayer, compression knapsack sprayer, compression knapsack battery sprayer and ASPEE-HTP power sprayer etc. fitted with hollow cone nozzle.

Time of Application : -

Precautions : 1. Keep away from foodstuffs, empty foodstuff containers and animals food. 2. Avoid contact with mouth, eyes and skin. 3. Avoid inhalation the spray mist. Spray in the direction of wind. 4 . Wash thoroughly the contaminated clothes and parts of the body after spraying. 5. Do not smoke, drink, eat and chew anything while spraying. 6. Wear full protective clothing while mixing and spraying.

Symptoms Of Poisoning : Headache, giddiness, vertigo,nausea, vomiting, blurred vision, diarrhoea convulsions, sweating, excessive lacrimation, and salivation may occur.

First Aid : 1. If swallowed, induce vomiting by tickling the back of throat. Repeat it until the vomitus is clear. Do not induce vomiting if the patient is unconscious. 2. If clothing and skin are contaminated, remove the clothes and wash the contaminated skin with copious amount of soap and water. 3. If eyes are contaiminated, flush with plenty of saline/clean water for about 10 to 15 minutes. 4. If inhaled, remove the patient to fresh air.

Phytotoxicity : The product is not phytotoxic when used as per field recommendation.

Antidote : 1. Atropinize the patient immediately and maintain full atropinization by repeated doses of 2 to 4 mg. of atropine sulphate intravenously at 5 to 10 minutes interval. As much as 25 to 50 mg. of atropine may be required in a day. The need for further atropine administration is guided by the continuance of symptoms. Extent of salivation is a useful criterion for dose adjustment. 2. Dissolve 1-2 gm of 2 PAM in 10 ml distilled water and inject intravenously very slowly for 10-15 minutes.

Disposal Of Used Container : 1. It shall be the duty of manufactures formulators and operator to disposed off packages or surplus materials and washings from the machine and container in a safe manner so as to prevent environmental and water pollution. 2. The used packages shall not be left outside to prevent their re-use. 3. Packages shall be broken and burried away from habitation.

Storage Conditions : 1. The rooms or premises meant for storing the insecticide shall be well built, dry, well lit and ventilated and of sufficient dimension to avoid contamination with vapour. 2. The packages containing the insecticide shall be stored in separate rooms or premises away from the articles of food or shall be kept in separate almirahs under key and lock depending upon the quality and nature of the insecticide.

Cemical Composition :

Monocrotophos Tech. (based on 68% w/w a.i.)	53.00 % w/w
Solvent Cyclohexanone	47.00 % w/w
Total :	100 % w/w

मोनोक्रोटोफास ३६ प्रतिशत सी.एस.
(कीटनाशक)

यह एक मोनोक्रोटोफास टेक्निकल से बनायी गयी पानी में घुलनशील कीटनाशक है । जो कि स्पर्श करने तथा शरीर के अन्दर जाने पर असर करती है । सावधान : जलीय जीवों के लिए जहरीला है इसलिए जल निकायों, जलीय कृषि के पास इस्तेमाल नहीं करना चाहिए । यह मधुमखियों के लिए जहरीला है, इसलिए जब मधुमखियाँ सक्रीय हो उस समय इसका छिड़काव न करें । यह उत्पाद पक्षियों के लिए अत्यधिक विषैला है ।

उपयोग :

फसल	कीट के नाम	प्रति हेक्टेयर मात्रा स. तत्व (ग्राम)	संरचना (मि.ली)	पानी की मात्रा / (लीटर)	अन्तिम छिड़काव तथा फसल काटने के बीच अन्तराल (दिनो मे)	पुनः प्रवेश की अवधि प्रत्येक छिड़काव के बाद (घंटे)
कला चना	फली छेदक	२५०	६२५	५००-१०००		
इलायची	सुरदा	३७५	९३७	५००-१०००		
नींबू	कला माहू,मकड़ी	०.०४० प्रतिशत ०.०२५ प्रतिशत	१५००- २०००	५००-२०००	१० लीटर/पेड़	
नारियल	काले सिर वाली सुंडी	३.५-७ ग्राम /पेड़	८.७५-१७.५ मि.ली./पेड़	कम खुराक	- ९ साल और उच्च या उस से अधिक ९ वर्ष	
कॉफ़ी	हरा बग	६२५	१५६२	५००-१०००		
कपास	मिलीबार डोडें की सूंडी	४५०-८००	१९२५-२२५०	५००-१०००		
कपास	गुलाबी डोडें की सूंडी	८००	२२५०	५००-१०००		
	सुरा घुन	५००	१२५०	५००-१०००		
	मिलीबार डोडें की सूंडी	४५०-८००	१९२५- २२५०	५००-१०००		
	सुरा घुन	५००	१२५०	५००-१०००		
	मिलीबार डोडें की सूंडी	४५०-८००	१९२५- २२५०	५००-१०००		
	पत्ती का फुदका	१७५	४३७	५००-१०००		
	सुरदा	१७५	४३७	५००-१०००		
	सफेद मक्खी	२००	५००	५००-१०००		
	पेथा	१७५	४३७	५००-१०००		
	पत्ती का फुदका	१७५	४३७	५००-१०००		
	अमेरिकन डोडें की सूंडी	४५०-८००	१९२५- २२५०	५००-१०००		
	पेथा	१७५	४३७	५००-१०००		
	अमेरिकन डोडें की सूंडी	४५०-८००	१९२५- २२५०	५००-१०००		
	सुरदा	१७५	४३७	५००-१०००		
	सफेद मक्खी	२००	५००	५००-१०००		
हरा चना	फली छेदक	१७५	४३७	५००-१०००		
भक्कस	तना मक्खी	२५०	६२५	५००-१०००		
	तना मक्खी	२५०	६२५	५००-१०००		
आम	बग माईट, गॉल मेकर, हॉपर, गिले	०.०४०प्रतिशत, ०.०४ प्रतिशत	१५००- २०००	५००-२०००	१० लीटर/ पेड़ २० लीटर/ पेड़	
धान	पीला तना छेदक	५००	१२५०	५००-१०००		
	पीला तना छेदक	५००	१२५०	५००-१०००		
	हरी पत्ती का फुदका	२५०	६२५	५००-१०००		
	हरी पत्ती का फुदका	२५०	६२५	५००-१०००		
	भूरे पीले का फुदका	५००	१२५०	५००-१०००		
	पत्ती लपेटक/ भोंडक	२५०	६२५	५००-१०००		
	पत्ती लपेटक/ भोंडक	२५०	६२५	५००-१०००		
मटर	पत्ती सुरंगी कीट	४००	१०००	५००-१०००		
	पत्ती सुरंगी कीट	४००	१०००	५००-१०००		
अरहर	फ्लूत माउथ, फली छेदक, फली मक्खी	२५०,५०० २५०	६२५,१२५० ६२५	५००-१०००		
गन्ना	शूट बोरर, मिली बग, सकेल कीडा, स्टाक बोरर	६००-८०० ६००,२००, ६००,७५०	१५००- २२५०, ५०० १५००,१८७५	५००-१०००		

उपयोग के लिये दिशा - निर्देश : चेतावनी : शाक-सब्जियों पर उपयोग पर पाबंदी। उपयोग में आने वाले यंत्र: नेपसेक स्प्रेयर, फूट स्प्रेयर, कम्प्रेशन नेपसेक बैटरी स्प्रेयर और एस.पी.ई.ई. - एच.टी.पी. पावर स्प्रेयर आदि जिसमें खाली कोण नोजिल लगा हो ।

प्रयोग का समय : छ

प्रयोगकर्ताओं के लिए सावधानियां : १. खाद्यसामग्री, खाद्य सामग्री, के खाली बर्तनों और पशुओं के चारे से दूर रखें । २. मुंह, आँखो, त्वचा को सम्पर्क से बचाये । ३. छिड़काव की वाष्प को सांस द्वारा अन्दर जाने से बचाये। हवा की दिशा मे छिड़काव करे । ४. छिड़काव के बाद दूषित कपड़ो और शरीर के अंगो को अच्छी तरह धोएं । ५. छिड़काव के समय धुम्रपाम, खाना, पीना और कुछ चबानी नही चाहिए । ६. छिड़काव करते या मिलाते समय पूर्ण सुरक्षात्मक कपड़े पहने ।

विष के लक्षण : सिरदर्द, चक्कर आना, धुंधला दिखना, मितली, उल्टी, दस्त, झटके (मिरगी) अधिक पसीना आना, आंस आना और लार टपकना हो सकते हैं ।

प्राथमिक चिकित्सा : १. यदि निगल जाये तो गले के पीछे गुदगुदी करके उल्टी कराए । यह क्रिया तब तक दोहराते रहे जब तक उल्टी दारा निकला पदार्थ साफ न हो जाए । यदि मरीज बेहोश हो तो उल्टी न करायें । २. यदि कपडे और त्वचा दूषित हो जाए तो दूषित कपडों को उतार दे दूषित त्वचा को काफी मात्रा में साबुन और पानी से धोएं । ३. यदि आँखे दूषित हो जाए तो उनको काफी मात्रा में सैलाइन/साफ पानी में लगभग १०-१५ मिनट तक धोएं । ४. यदि सांस दारा अन्दर गद्रा हो तो रोगी को शुद्ध हवा मे ले जाये ।

पौधविशाक्तता : सुझाव की मात्रा के अनुसार प्रयोग करने पर यह कीटनाशक पौधविशाक्त नहीं है ।

विषनाशक : १. रोगी को तुरंन्त एट्रोपिन दीजिए और इसकी २ से ४ मिग्रा. तक की खुराक ५ से १० मिनट के अन्तराल पर अन्तः शिरा द्वारा लगातार देते हुए पूर्ण एट्रोपिनाइज रखिए । एक दिन में एट्रोपिन सल्फेट की अधिक से अधिक २५ से १० मिग्रा. तक की मात्रा की आवश्यकता पड सकती है । एट्रोपिन सल्फेट की और मात्रा लक्षणों के बरकरार रहते दी जा सकती हैं । एट्रोपिन की कितनी खुराक देनी चाहिए इसके लिए मुंह से निकलने वाली लार एक लाभदायक कसौटी हैं । २. १ से २ ग्राम २ पी.ए.एम. १० मि.ली. आसुत जल में घोलकर अन्तः शिरा द्वारा बहुत छीरे धीरे १० से १५ मिनट मे देना चाहिए ।

खाली डिब्बों का निपटारा : १. कीटनाशक निर्माताओ या उपयोग कर्ता का कर्तव्य हैं कि डिब्बों या पात्रों को तोडफोडकर आबादी से दूर जमीन में गाड देना चाहिये । २. प्रयोग किये गये डिब्बों को दोबारा प्रयोग के लिं बाहर खुला न छोडें । ३. डिब्बों या बची कीटनाशक या धोवन का निपटारा इस प्रकार करें कि जिससे आसपास की चीजें, पीने का पानी विषैला न हों ।

संग्रहण की शर्तें : १. कीटनाशक के डिब्बों को अलग - अलग कमरों या आलमारियों मे जिनमें अन्य वस्तुएं विशेषकर खाद्य पदार्थ या पशु आहार संग्रहित किए जाते है से दूर अन्य कमरों में या आलमारियों में ताला चाबी में बं रखें । २. जिन कमरे अथवा आलमारियोग में कीटनाशक का भंडारण करना हो यह अच्छी तरह बना हुआ, सूखा, प्रकाश युक्त, हवादार, व पर्याप्त लम्बा चौडा होना चाहये तकि कीटनाशक की भाप से वातावरण प्रदूषण होने का डर न हो ।

रसायनिक संरचना :

मोनोक्रोटोफास टेक्निकल (भार के हिसाब से ६८ प्रतिशत स.त.पर आधारित)	५३.००% भार/भार
घोलक सायक्लोहेक्सानोन	४७.००% भार/भार
	कुल : १००% भार/भार

चेतावनी: इस लेबल/हस्त पत्रिका में दी गई फसलों के अलावा अन्य किसी भी फसल पर इसका उपयोग न करें ।

MONOSELL

Monocrotophos 36% S.L. (Insecticides)

మోనొక్రొటొఫాస్ 36% ఎస్.ఎల్. (కీటకనాశిని)

मोनोक्रोटोफॉस ३६% एस.एल.
(कीटनाशक)

ಮೋನೋಕ್ರೋಟಾಫಾಸ್ 36% ಎಸ್.ಎಲ್.
(ಕೀಟನಾಶಕ)

மோனோக்ரோடாபாஸ் 36% எஸ்.எல்.
(பூச்சிக்கொல்லி)

INSTRUCTIONS FOR USE

KEEP OUT OF THE REACH OF CHILDREN
పిల్లలకు దూరముగా ఉంచండి.
बच्चों से दूर रखिए।
ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಿಗದಂತೆ ದೂರವಿಡಿ.

जहर
ವಿಷಂ
విష విషము
POISON

READ THE ENTIRE LABEL AND LEAFLET BEFORE USE
ఉపయోగించుటకు ముందు లేబిల్‌ను మరియు కరపత్రమును జాగ్రత్తగా చదువవలయును.
इस्तेमाल करने से पहले सारी पर्ची पूरी तरह पढिये।
ಬಳಕೆಗೆ ಮೊದಲು ಸಂಪೂರ್ಣ ಲೇಬಲ್ ಮತ್ತು ಕರಪತ್ರವನ್ನು ಓದಿ
பயன்பாட்டிற்கு முன் முழு லேபிள் மற்றும் துண்டுப்பிரசுரத்தையும் படிக்கவும்

Manufactured & Marketed by :

Maa Agri Sciences Private Limited

Survey No. 734, Mandollagudem Village, Chinnakondur,
Choutuppal Mandal, Bhuvanagiri Dist. - 508252, T.S. India
Customer Care No. : 08694293575, E-mail : maaagri2020@gmail.com

Regd. No. : CIR- 324308/2023-Monocrotophos (SL) (447)-932
Mfg. Lic No. 117/TS-IML/2023

ಮೋನೋಕ್ರೊಟೋಫಾಸ್-36% ಎಸ್.ಎಲ್.
(ಪ್ರಚಿಕಕೊಲಂಬಿ)

ಮೋನೋಕ್ರೊಟೋಟೊಫಾಸ್ ಥಿಯೋಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಸಾವಯವ ಸಂಯುಕ್ತ ಮತ್ತು ಸಂಪರ್ಕ ಕ್ರಿಯೆಯ ಒಂದು ಕೀಟನಾಶಕ. ಇದು ಕೀಟಗಳ ನರಮಂಡಲದ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕೀಟಗಳ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಸಂಪರ್ಕ ಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತು ಆಂತರಿಕ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಕೀಟನಾಶಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಶಿಫಾರಸು:

ಬೆಳೆ(ಗಳು)	ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೆಸರು ಕೀಟದ	ಡೋಸೇಜ್/ಎಎಎ ಎಎಎ	ಸಸ್ಯಕ್ಕೆ ಕೊಡುವ ಡೋಸ್	ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕರಗಿದ ಪರಿಮಾಣ (ಲೀಟರ್)	ಸಲಹೆ ಮಾಡಿದ ಸೂತ್ರೀಕರಣ (ಇದೇ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ)
ಕನ್ನಡ ಗ್ರಾಂ	ಜಾಡ್ ಕೊರಕ	250	625	500–1000	–
ಎಲಕ್ಕಿ	ಥ್ರಿಪ್ಸ್,	375	937	500–1000	–
ಸಿಟ್ರಸ್	ಕನ್ನಡ ಗಿಡಹೇನುಗಳು, ಮಿಟೆ	0.040%, 0.025%	1500–2000, 937–1250	500–2000 10ಲೀಟರ್/ಮರ	
	ತೆಂಗಿನ ಕನ್ನಡ ತಲೆ ಕ್ಯಾಟರ್‌ಪಿಲ್ಲರ್ ಮಿಲಿ / ಮರದ ಡೋಸ್ ಅಗಿರಬೇಕು	3.5–7 ಗ್ರಾಂ/ಮರ	8.75–17.5 ಕಿಡಿ –	ಮೇಲೆ ಆಕ್ಸಿಯಿಸಲಾಗಿದೆ ಗಿಡಗಳು 9 ಕೆಳಗೆ ಮರಗಳು	
ಕಾಫಿ	ಗ್ರೀನ್ ಬಗ್	625	1562	500–1000	–
ಹತ್ತಿ	ಮಚ್ಚೆಯುಳ್ಳ ಬೋಲ್ ವರ್ಮ್	450–800	1125–2250	500–1000	–
ಕಾಟನ್	ಪಿಂಕ್ ಬೋಲ್ ವರ್ಮ್	800	2250	500–1000	
ಬೂಹು	ಜೀಗುಂಡೆ	500	1250	500–1000	
ಮಚ್ಚೆಯುಳ್ಳ ಹುಳು		450–800	1125–2250	500–1000	
ಲೀಫ್ ಹಾಪರ್		175	437	500–1000	
ಥ್ರಿಪ್ಸ್,		175	437	500–1000	–
ಮೈಟ್	ಸ್ಪೈ	200	500	500–1000	–
	ಗಿಡಹೇನು	175	437	500–1000	–
ಲೀಫ್	ಹಾಪರ್	175	437	500–1000	–
ಅಮೆರಿಕನ್ ಬೋಲ್ ವರ್ಮ್		450–800	1125–2250	500–1000	–
ಗಿಡಹೇನು		175	437	500–1000	
ಅಮೆರಿಕನ್ ಬೋಲ್ ವರ್ಮ್		450–800	1125–2250	500–1000	
ಬೂಹು ಜೀಗುಂಡೆ		500	1250	500–1000	–
ಪಿಂಕ್ ಬೋಲ್ ವರ್ಮ್		800	2250	500–1000	–
ಥ್ರಿಪ್ಸ್,		175	437	500–1000	
ಮೈಟ್ ಸ್ಪೈ		200	500	500–1000	
ಹಸಿರು ಜಾಡ್ ಕೊರಕ		175	437	500–1000	–
ಗ್ರಾಂ					
ಮೆಕ್ಕೆ ಜೋಳದ ಚಿಗುರು ನೊಣ		250	625	500–1000	
ಶೂಟ್ ಫ್ಲೈ		250	625	500–1000	–
ಮ್ಯಾಂಗೊ ಬಗ್ ಎಬಿ, ಗಾಲ್ ಮೇಕರ್		0.040%,	1500	500–2000 10ಲೀಟರ್	
ಹಾಪರ್, ಮೇಲೇ ಬಗ್,		0.04% –	2000 / ಮರ	ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮೂರರ 20 ಲೀಟರ್ / ಮರ	
ಭತ್ತದ ಹಳದಿ ಕಾಂಡ ಕೊರೆಯುವ ಹುಳು		500	1250	500–1000	
ಹಳದಿ	ಕಾಂಡ ಕೊರಕ	500	1250	500–1000	–
ಗ್ರೀನ್ ಲೀಫ್ ಹಾಪರ್		250	625	500–1000	–
ಗ್ರೀನ್ ಲೀಫ್ ಹಾಪರ್		250	625	500–1000	–
ಬ್ರೌನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಹಾಪರ್		500	1250	500–1000	–
ಲೀಫ್ ರೋಲರ್/ಫೋಲ್ಡರ್		250	625	500–1000	–
ಲೀಫ್ ರೋಲರ್/ಫೋಲ್ಡರ್		250	625	500–1000	–
ಬಟಾಣಿ ಎಲೆ ಗಣಿಗಾರ		400	1000	500–1000	
ಲೀಫ್ ಮೈನರ್		400	1000	500–1000	–
ರೆಡ್ ಫ್ಲಾಟ್ ಮೈಟ್,		250, 500, 250	625,1250,	500–1000	–
ಗ್ರಾಂ ಜಾಡ್ ಕೊರಕ, ಜಾಡ್ ಫ್ಲೈ			625		
ಸಕ್ಕರೆ ಚಿಗುರು ಕೊರೆ, ಮೀಲಿ		600–800, 600,	1500–2250,	500–1000	
ಕಬ್ಬಿನ ದೂಸಾ, ಪಿಂಪ್ಲಿ ಸ್ಕೇಲ್		200,600,750	1500, 500,		
ಕಬು, ಕಾಂಡ ಕೊರೆಯುವ ಹುಳು		1500, 1875			

ಬಳಕೆಯ ನಿರ್ದೇಶನ: ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ತರಕಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲು ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಕಿ.ಕಿ. ಸಲಕರಣೆ:–ನಾಪ್‌ಸಾಕ್ಸ್ ಸ್ಪ್ರೇಯರ್, ಫುಟ್ ಸ್ಪ್ರೇಯರ್, ಕಂಪ್ರೆಷನ್ ನ್ಯಾಪ್‌ಸಾಕ್ ಸ್ಪ್ರೇಯರ್, ಕಂಪ್ರೆಷನ್ ನ್ಯಾಪ್‌ಸಾಕ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ಸ್ಪ್ರೇಯರ್ ಮತ್ತು ಎಎಸ್‌ಪಿಇಇ–ಎಚ್‌ಟಿಪಿ ಪವರ್ ಸ್ಪ್ರೇಯರ್ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಟೊಳ್ಳಾದ ಕೋನ್ ನಳಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸಮಯ: –

ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟಿರುಕೆಗಳು : 1. ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳು, ಖಾಲಿ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ಯಾಕೆಗಳ ಆಹಾರದಿಂದ ದೂರವಿರಿ. 2. ಬಾಯಿ, ಕಣ್ಣು ಮತ್ತು ಚರ್ಮದ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. 3. ಸ್ಪ್ರೇ ಮಂಜನ್ನು ಇನ್ಹಲೇಷನ್ ಮಾಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ, ಗಾಳಿಯ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಡಿಸಿ. 4. ಸಿಂಪಡಿಸಿದ ನಂತರ ಕಲುಷಿತ ಬಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ದೇಹದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆಯಿರಿ. 5. ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡುವಾಗ ಧೂಮಪಾನ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಕುಡಿಯಬೇಡಿ, ತಿನ್ನಬೇಡಿ ಮತ್ತು ಅಗಿಯಬೇಡಿ. 6. ಮಿಶ್ರಣ ಮತ್ತು ಸಿಂಪಡಿಸುವಾಗ ಸಂಪೂರ್ಣ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಉಡುಪುಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ.

ವಿಷದ ಲಕ್ಷಣಗಳು: ತಲೆನೋವು, ತಲೆತಿರುಗುವಿಕೆ, ತಲೆತಿರುಗುವಿಕೆ, ವಾಂತಿ, ದೃಷ್ಟಿ ಮಂದವಾಗುವುದು, ಅತಿಸಾರ ಸೆಳೆತ, ಬೆವರುವುದು, ಅತಿಯಾದ ಲ್ಯಾಕ್ರಿಮೇಷನ್ ಮತ್ತು ಜೊಲ್ಲು ಸುರಿಸುವುದು ಸಂಭವಿಸಬಹುದು.

ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ : 1. ನುಂಗಿದರೆ, ಗಂಟಲಿನ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಚಗುಳಿಯಿಡುವ ಮೂಲಕ ವಾಂತಿಗೆ ಪ್ರೇರೇಪಿಸುತ್ತದೆ. ವಾಂತಿ ಸ್ವಯಮಾಗುವವರೆಗೆ ಅದನ್ನು ಪುನರಾವರ್ತಿಸಿ, ರೋಗಿಯು ಪ್ರಜ್ಞಾಹೀನ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ ವಾಂತಿ ಮಾಡಬೇಡಿ. 2. ಬಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಚರ್ಮವು ಕಲುಷಿತವಾಗಿದ್ದರೆ, ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ ಮತ್ತು ಕಲುಷಿತ ಚರ್ಮವನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದ ಸಾಬೂನು ಮತ್ತು ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆಯಿರಿ. 3. ಕಣ್ಣುಗಳು ಕಲುಷಿತವಾಗಿದ್ದರೆ, ಸುಮಾರು 10 ರಿಂದ 15 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಸಾಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು/ಶುದ್ಧ ನೀರಿನಿಂದ ಫ್ಲಶ್ ಮಾಡಿ. 4. ಉಸಿರಾಡಿದರೆ, ರೋಗಿಯನ್ನು ತಾಜಾ ಗಾಳಿಗೆ ತೆಗೆದುಹಾಕಿ.

ಫೈಟೊಟಾಕ್ಸಿಸಿಟಿ : ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ ಪ್ರಕಾರ ಬಳಸಿದಾಗ ಉತ್ಪನ್ನವು ಫೈಟೊಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.

ಪ್ರತಿವಿಷ : 1. ರೋಗಿಯನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಆಟ್ರೋಪಿನೈಸ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು 2 ರಿಂದ 4 ಮಿಗ್ರಾಂ ಪ್ರೊನಲಾಪಾರ್ಕಿನ್ ಡೋಸ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಟ್ರೋಪಿನೈಸೇಶನ್ ಅನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿ, 5 ರಿಂದ 10 ನಿಮಿಷಗಳ ಮಧ್ಯಂತರದಲ್ಲಿ ಅಭಿದಮನಿ ಮೂಲಕ ಆಟ್ರೋಪಿನ್ ಸಲ್ಫೇಟ್. 25 ರಿಂದ 50 ಮಿಗ್ರಾಂ. ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ಆಟ್ರೋಪಿನ್ ಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಮತ್ತಷ್ಟು ಆಟ್ರೋಪಿನ್ ಆಡಳಿತದ ಅಗತ್ಯವು ಆಕ್ರಮಣದ ತೀವ್ರತೆಯನ್ನು ನಿರಂತರತೆಯಿಂದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಜೊಲ್ಲು ಸುರಿಸುವ ಪ್ರಮಾಣವು ಡೋಸ್ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಗೆ ಉಪಯುಕ್ತ ಮಾನದಂಡವಾಗಿದೆ. 2. 2 ಕಿಂಟಾ ನ 1–2 ಗ್ರಾಂ ಅನ್ನು 10 ಮಿಲಿ ಬಟ್ಟಿ ಇಳಿಸಿದ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕರಗಿಸಿ ಸಾಮಾನ್ಯ 10–15 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಬಹಳ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಅಭಿದಮನಿ ಮೂಲಕ ಚುಚ್ಚುಮದ್ದು ಮಾಡಿ. ಬಳಸಿದ ಕಂಟೈನರ್‌ನ ವಿಲೇವಾರಿ : 1. ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಜಲ ಮಾಲಿನ್ಯವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಪ್ಯಾಕೇಜುಗಳು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ತೊಳೆಯುವಿಕೆಯನ್ನು ಯಾವತ್ತೂ ಮತ್ತು ಕಂಟೈನರ್‌ಗಳಿಂದ ಸುರಕ್ಷಿತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡುವುದು ತಯಾರಕರು ಮತ್ತು ನಿರ್ವಾಹಕರ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. 2. ಬಳಸಿದ ಪ್ಯಾಕೇಜುಗಳನ್ನು ಅವುಗಳ ಮರು–ಬಳಕೆಯನ್ನು ತಡೆಯಲು ಹೊರಗೆ ಬಡಿದಾದರು. 3. ಪ್ಯಾಕೇಜುಗಳನ್ನು ಮುರಿದು ವಾಸಸ್ಥಳದಿಂದ ಹೂಳಬೇಕು.

ಶೇಖರಣಾ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು: 1. ಕೀಟನಾಶಕವನ್ನು ಸಾಗಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾದ ಕೊಡಡಿಗಳು ಅಥವಾ ಆವರಣಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಳ್ಳಬೇಕು, ಶುಷ್ಕ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳಕು ಮತ್ತು ಗಾಳಿ ಮತ್ತು ಆವಿಯಾದ ಮಾಲಿನ್ಯವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಆಯಾಮವನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು. 2. ಕೀಟನಾಶಕವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಪೊಟ್ಟಣಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕೊಡಡಿಗಳು ಅಥವಾ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಆಹಾರದ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ದೂರದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಬೇಕು ಅಥವಾ ಕೀಟನಾಶಕದ ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಕೀ ಮತ್ತು ಲಾಕ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಅಲ್ಮಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು.

ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ:

ಮೊನೊಕ್ರೊಟೊಫಾಸ್ ಟೆಕ್. (68% ಡಿ/ಡಿ ಚಿ.ವಿ. ಆಧರಿಸಿ)	53.00 % ಡಿ/ಡಿ
ದ್ರಾವಕ ಸೈಕ್ಲೋಹೆಕ್ಸಾನೋನ್	47.00 % ಡಿ/ಡಿ
ಒಟ್ಟು:	100 % ಡಿ/ಡಿ

ಮೊನೊಕ್ರೊಟೊಫಾಸ್–36% ಎಸ್.ಎಲ್.
(ಕೀಟನಾಶಕ)

ಮೊನೊಕ್ರೊಟೊಫಾಸ್ ತಾಂತ್ರಿಕತೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಮತ್ತು ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಕರಗುವ ದ್ರವ ಸೂತ್ರೀಕರಣ * ಎಚ್ಚರಿಕೆ : ಜಲಚರಗಳಿಗೆ ವಿಷಕಾರಿ ಆದ್ದರಿಂದ ಜಲಮೂಲಗಳು, ಜಲಚರಗಳು ಅಥವಾ ಮೀನುಗಾರಿಕೆಯ ಬಳಿ ಬಳಸಬಾರದು. ಇದು ಜೇನುನೊಣಗಳಿಗೆ ವಿಷಕಾರಿಯಾಗಿದೆ, ಜೇನುನೊಣಗಳ ಆಹಾರದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪೇ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ಉತ್ಪನ್ನವು ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ವಿಷಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.

ಶಿಫಾರಸು:

ಬೆಳೆ(ಗಳು)	ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೆಸರು ಕೀಟದ	ಡೋಸೇಜ್/ಎಎಎ ಎಎಎ	ಸಸ್ಯಕ್ಕೆ ಕೊಡುವ ಡೋಸ್	ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕರಗಿದ ಪರಿಮಾಣ (ಲೀಟರ್)	ಸಲಹೆ ಮಾಡಿದ ಸೂತ್ರೀಕರಣ (ಇದೇ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ)
ಕನ್ನಡ ಗ್ರಾಂ	ಜಾಡ್ ಕೊರಕ	250	625	500–1000	–
ಎಲಕ್ಕಿ	ಥ್ರಿಪ್ಸ್,	375	937	500–1000	–
ಸಿಟ್ರಸ್	ಕನ್ನಡ ಗಿಡಹೇನುಗಳು, ಮಿಟೆ	0.040%, 0.025%	1500–2000, 937–1250	500–2000 10ಲೀಟರ್/ಮರ	
	ತೆಂಗಿನ ಕನ್ನಡ ತಲೆ ಕ್ಯಾಟರ್‌ಪಿಲ್ಲರ್ ಮಿಲಿ / ಮರದ ಡೋಸ್ ಅಗಿರಬೇಕು	3.5–7 ಗ್ರಾಂ/ಮರ	8.75–17.5 ಕಿಡಿ –	ಮೇಲೆ ಆಕ್ಸಿಯಿಸಲಾಗಿದೆ ಗಿಡಗಳು 9 ಕೆಳಗೆ ಮರಗಳು	
ಕಾಫಿ	ಗ್ರೀನ್ ಬಗ್	625	1562	500–1000	–
ಹತ್ತಿ	ಮಚ್ಚೆಯುಳ್ಳ ಬೋಲ್ ವರ್ಮ್	450–800	1125–2250	500–1000	–
ಕಾಟನ್	ಪಿಂಕ್ ಬೋಲ್ ವರ್ಮ್	800	2250	500–1000	
ಬೂಹು	ಜೀಗುಂಡೆ	500	1250	500–1000	
ಮಚ್ಚೆಯುಳ್ಳ ಹುಳು		450–800	1125–2250	500–1000	
ಲೀಫ್ ಹಾಪರ್		175	437	500–1000	
ಥ್ರಿಪ್ಸ್,		175	437	500–1000	–
ಮೈಟ್	ಸ್ಪೈ	200	500	500–1000	–
	ಗಿಡಹೇನು	175	437	500–1000	–
ಲೀಫ್	ಹಾಪರ್	175	437	500–1000	–
ಅಮೆರಿಕನ್ ಬೋಲ್ ವರ್ಮ್		450–800	1125–2250	500–1000	–
ಗಿಡಹೇನು		175	437	500–1000	
ಅಮೆರಿಕನ್ ಬೋಲ್ ವರ್ಮ್		450–800	1125–2250	500–1000	
ಬೂಹು ಜೀಗುಂಡೆ		500	1250	500–1000	–
ಪಿಂಕ್ ಬೋಲ್ ವರ್ಮ್		800	2250	500–1000	–
ಥ್ರಿಪ್ಸ್,		175	437	500–1000	
ಮೈಟ್ ಸ್ಪೈ		200	500	500–1000	
ಹಸಿರು ಜಾಡ್ ಕೊರಕ		175	437	500–1000	–
ಗ್ರಾಂ					
ಮೆಕ್ಕೆ ಜೋಳದ ಚಿಗುರು ನೊಣ		250	625	500–1000	
ಶೂಟ್ ಫ್ಲೈ		250	625	500–1000	–
ಮ್ಯಾಂಗೊ ಬಗ್ ಎಬಿ, ಗಾಲ್ ಮೇಕರ್		0.040%,	1500	500–2000 10ಲೀಟರ್	
ಹಾಪರ್, ಮೇಲೇ ಬಗ್,		0.04% –	2000 / ಮರ	ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮೂರರ 20 ಲೀಟರ್ / ಮರ	
ಭತ್ತದ ಹಳದಿ ಕಾಂಡ ಕೊರೆಯುವ ಹುಳು		500	1250	500–1000	
ಹಳದಿ	ಕಾಂಡ ಕೊರಕ	500	1250	500–1000	–
ಗ್ರೀನ್ ಲೀಫ್ ಹಾಪರ್		250	625	500–1000	–
ಗ್ರೀನ್ ಲೀಫ್ ಹಾಪರ್		250	625	500–1000	–
ಬ್ರೌನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಹಾಪರ್		500	1250	500–1000	–
ಲೀಫ್ ರೋಲರ್/ಫೋಲ್ಡರ್		250	625	500–1000	–
ಲೀಫ್ ರೋಲರ್/ಫೋಲ್ಡರ್		250	625	500–1000	–
ಬಟಾಣಿ ಎಲೆ ಗಣಿಗಾರ		400	1000	500–1000	
ಲೀಫ್ ಮೈನರ್		400	1000	500–1000	–
ರೆಡ್ ಫ್ಲಾಟ್ ಮೈಟ್,		250, 500, 250	625,1250,	500–1000	–
ಗ್ರಾಂ ಜಾಡ್ ಕೊರಕ, ಜಾಡ್ ಫ್ಲೈ			625		
ಸಕ್ಕರೆ ಚಿಗುರು ಕೊರೆ, ಮೀಲಿ		600–800, 600,	1500–2250,	500–1000	
ಕಬ್ಬಿನ ದೂಸಾ, ಪಿಂಪ್ಲಿ ಸ್ಕೇಲ್		200,600,750	1500, 500,		
ಕಬು, ಕಾಂಡ ಕೊರೆಯುವ ಹುಳು		1500, 1875			

ಬಳಕೆಯ ನಿರ್ದೇಶನ: ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ತರಕಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲು ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಕಿ.ಕಿ. ಸಲಕರಣೆ:–ನಾಪ್‌ಸಾಕ್ಸ್ ಸ್ಪ್ರೇಯರ್, ಫುಟ್ ಸ್ಪ್ರೇಯರ್, ಕಂಪ್ರೆಷನ್ ನ್ಯಾಪ್‌ಸಾಕ್ ಸ್ಪ್ರೇಯರ್, ಕಂಪ್ರೆಷನ್ ನ್ಯಾಪ್‌ಸಾಕ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ಸ್ಪ್ರೇಯರ್ ಮತ್ತು ASPEE-HTP ಪವರ್ ಸ್ಪ್ರೇಯರ್ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಟೊಳ್ಳಾದ ಕೋನ್ ನಾಜಿಲ್‌ತೋ ಅಮಳ್ಳಬಡಿ ಉಂಟಾಯಿ.

ದರಖಾಸ್ತು ಸಮಯಂ: –

ಜಾಗ್ರತ್ತಲು : 1. ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಂಲು, ಖಾಳಿ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಾಲ ಕಂಟೈನರ್ಲು ಮರಿಯು ಜಂತುವುಲ ಆಹಾರಂ ನುಂಡಿ ದೂರಂಗಾ ಉಂಚಂಡಿ. 2. ನೋರು, ಕಳ್ಳು ಮರಿಯು ಚರ್ಮಂತೋ ಸಂಬಂಧಾಲ್ನಿ ನಿವಾರಿಂಚಂಡಿ. 3. ಸ್ಪ್ರೆ ಮಿಸ್ತ್‌ನು ಪೀಲ್ಚುದು ಮಾನುಕೋಂಡಿ. ಗಾಲಿ ದಿಶಲೌ ಸ್ಪ್ರೆ ಚೆಯಂಡಿ. 4 . ಸ್ಪ್ರೆ ಚೆಸಿನ ತರ್ವಾತ ಕಲುಷಿತಮೈನ ಬಟ್ಟಲು ಮರಿಯು ಶರೀರ ಭಾಗಾಲನು ಬಾಗಾ ಕಡಗಿಲಿ. 5. ಸ್ಪ್ರೆ ಚೆಸೆಟಪುಡು ಪೊಗ ತ್ರಾಗಕೂಡದು, ತ್ರಾಗಕೂಡದು, ತಿನಕೂಡದು ಮರಿಯು ನಮಲಕೂಡದು. 6. ಮಿಕ್ಶಿಂಗ್ ಮರಿಯು ಸ್ಪ್ರೆ ಚೆಸೆಟಪ್ಪುಡು ಪೂರ್ತಿ ರಕ್ಷಣ ದುಸ್ತುಲನು ಧರಿಂಚಂಡಿ.

ವಿಷಂ ಯೊಕ್ಕ ಲಕ್ಷಣಾಲು: ತಲನೊಪ್ಪಿ, ತಿಮ್ಮಿರಿ, ತ್ರಿಲ್ಲಿಗೌ, ವಿಕಾರಂ, ವಾಂತಲು, ಅಸ್ಪಷ್ಟಮೈನ ದೃಷ್ಟಿ, ಅತಿಸಾರಂ ಮೂರ್ಛಲು, ವೆಮಟ, ಅಧಿಕ ಚನುಬಾಲಿವ್ವಡಂ ಮರಿಯು ಲಾಲಾಜಲಮು ಸಂಭವಿಂಚವಚ್ಚು.

ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸ : 1. ಮಿಂಗಿತೆ, ಗೊಂಯಿ ವೆನುಕ ಭಾಗಂಲಿಳಿಗಿಂಚಲು ಪೆಟ್ಟಡಂ ದ್ವಾರಾ ವಾಂತಲು ವಚ್ಚೆಲಾ ಚೆಸ್ತಾಯಿ. ವಾಂತಿ ಸ್ವಯಂಗಾ ಕನಿಪಿಂಚೆಲೆ ವರಕು ದೀನ್ನಿ ಪುನರಾವೃತ್ತಂ ಚೆಯಂಡಿ. ರೋಗಿ ಅಪಸ್ಮಾರಕ ಸ್ಥಿತಿಲೋ ಉಂಟೆ ವಾಂತಿನಿ ಗ್ರೂಪಿಂಚವದ್ದು. 2. ದುಸ್ತುಲು ಮರಿಯು ಚರ್ಮಂ ಕಲುಷಿತಮೈತೆ, ಬಟ್ಟಲು ತೀಸೆಸಿ, ಕಲುಷಿತಮೈನ ಪರ್ಶ್ವಾನ್ನಿ ಅಧಿಕ ಮೊತ್ತಲೋ ಸಬ್ಬು ಮರಿಯು ನೀಟಿತೌ ಕಡಗಾಲಿ. 3. ಕಳ್ಳು ಕಲುಷಿತಮೈತೆ, 10 ನಂಂಡಿ 15 ನಿಮಿಷಾಲ ಪಾಟು ಪುಷ್ಕಲಂಗಾ ಸೆಲ್ಲಿಸ್/ಕ್ಲೀನ್ ವಾಟರ್‌ತೌ ಪ್ಲಷ್ ಚೆಯಂಡಿ. 4. ಪೀಲ್ಚಿನಪ್ಪಟ್ಟುಂತೆ, ರೋಗಿನಿ ತಾಜಾ ಗಾಲಿತಿ ಪೀನಿವೆಯಂಡಿ.

ಫೈಟೋಟಾಕ್ಸಿಸಿಟೆ : ಫೈಲ್ಡ್ ಸಿಫಾರ್ಸು ಪ್ರಕಾರಂ ಉಪಯೋಗಿಂಚಿನಪ್ಪುಡು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಫೈಟೋಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಕಾದು.

ವಿರುಗುಡು : 1. ರೋಗಿನಿ ತೆಂಟನೆ ಅಟ್ರೋಪಿನೈಜ್ ಚೆಯಂಡಿ ಮರಿಯು 2 ನುಂಡಿ 4 %ಎತ್ತಂ ಮೌತಾದುಲನು ಪುನರಾವೃತ್ತಂ ಚೆಯಂದ ದ್ವಾರಾ ಪೂರ್ತಿ ಅಟ್ರೋಪಿನೈಜೆಷನ್‌ನು ಕೊನಸಾಗಿಂಚಂಡಿ. 5 ನುಂಡಿ 10 ನಿಮಿಷಾಲ ವ್ಯವಧಿಲೋ ಇಂಟ್ರಾವೀನಸ್‌ಗಾ ಅಟ್ರೋಪಿನ್ ಸಲ್ಫೇಟ್. 25 ನುಂಡಿ 50 ಮಿ.ಗ್ರಾ. ಒಕ ರೋಜುಲೌ ಅಟ್ರೋಪಿನ್ ಅವಸರಂ ಕಾವಚ್ಚು. ಮರಿಂತ ಅಟ್ರೋಪಿನ್ ಪರಿಪಾಲನ ಅವಸರಂ ಲಕ್ಷಣಾಲ ಕೊನಸಾಗಿಂಪು ದ್ವಾರಾ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಂ ಚೆಯಬಡುತುಂಟುಂದಿ. ಲಾಲಾಜಲಂ ಯೊಕ್ಕ ಪರಿಧಿ ಮೌತಾದು ನಡುಮಲು ಕೊನಂ ಅವಯೋಗಪಡಿನ ಪ್ರಮಾಣಂ. 2. 2 %ಅಾಪಿಗೆ ಯೊಕ್ಕ 1–2 ಗ್ರಾಮುಲು 10 %ಎತ್ತಿಗೆ ನೈದ್ರವಣಲಂಲೌ ಕರಿಗಿಂದಿ, 10–15 ನಿಮಿಷಾಲ ಪಾಲ ನೆಮ್ಮದಿಗಾ ಇಂಟ್ರಾವೀನಸ್ ದ್ವಾರಾ ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಚೆಯಂಡಿ.

ಉಪಯೋಗಿಂಚಿನ ಕಂಟ್ರಾಸ್ಟಿನು ಪೀರವೆಯಂದು : 1. ಪರ್ಯಾವರಣ ಮರಿಯು ನೀಟಿ ಕಾಲುಪ್ಪಾನ್ನಿ ನಿವಾರಿಂಚವಲಾನಿಕಿ, ಯಂತ್ರಂ ಮರಿಯು ಕಂಟೈನರ್ ನುಂಡಿ ಪ್ಯಾಕೇಜುಲು ಲೇದಾ ಮಿಗಲು ಪದಾರ್ಥಾಲು ಮರಿಯು ವಾಹಿಗೆಲನು ಸುರಕ್ಷಿತಮೈನ ಪದ್ಧತಿಲೋ ಪಾರವೆಯಡಂ ತಯಾರಿದಾರುಲ ಫಾರ್ಮುಲೇಟಿಲು ಮರಿಯು ಅವರೇಟಲ್ಲ ವಿಧಿ. 2. ಉಪಯೋಗಿಂಚಿನ ಪ್ಯಾಕೇಜುಲು ತಿರಿಗಿ ಉಪಯೋಗಿಂಚಕುಂದಾ ನಿರೋಧಿಂದಾನಿಕಿ ವಾಟಿ ಐಯಟ ಉಂಚಕೂಡದು. 3. ಪ್ಯಾಕೇಜುಲು ವಿಲ್ಚುನ್ನಂ ಚೆ